

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

総合かぜ薬 のどの痛み、かぜの諸症状の緩和に

布亀かぜゴールドカプセルA

布亀かぜゴールドカプセルAは、リゾチーム塩酸塩、ゴオウ、ビタミンB₁、B₂をはじめとした10種類の有効成分が、かぜの諸症状に効果的に作用します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
- (3) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに右記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります)

4. 服用時は飲酒しないでください

5. 長期連用はしないでください



症状の名称	症状
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。 (これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

ぜんそく

- (2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、口のかわき

■効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

■用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	2カプセル	1日3回
7才以上15才未満	1カプセル	
7才未満の幼児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法、用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲みこんだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる可能性があります。)



■成分と作用

成分	6カプセル中	作用
アセトアミノフェン	900mg	発熱症状をしずめ、痛みをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
ジヒドロコデインリン酸塩	16mg	せきをしずめ、呼吸を楽にします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支を広げ、呼吸を楽にし、せきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg	たんをやわらかくし、出しやすくします。
無水カフェイン	75mg	痛みをおさえる働きを助けるほか、頭痛をしずめます。
リゾチーム塩酸塩(リゾチームとして)	60mg(力価)	たんを出しやすくします。また、のどの炎症をおさえます。
ビスイプチアミン(ビタミンB1誘導体)	24mg	かぜのときに消耗しやすい、ビタミンを補給します。
リボフラビン(ビタミンB2)	12mg	
ゴオウ	3mg	解熱、鎮静、鎮けい作用により、かぜの治りを早めます。

添加物として、ポビドン、タルク、カプセルに酸化チタン、黄色5号、カラギーナン、塩化カリウム、ジメチルポリシロキサン、ソルビタン脂肪酸エステル、ヒプロメロース、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

<成分と作用に関連する注意>

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のリボフラビン(ビタミンB2)によるもので、ご心配ありません。

■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)配置期限(外装に記載)をすぎた製品は服用しないでください。なお、配置期限内であっても開封後は6か月以内に服用してください。(品質保持のため)

■お問い合わせ先

本剤につきましてのお問い合わせは、下記にお願いいたします

布亀株式会社 お客様相談室

TEL : (0798) 35-9985

受付時間: 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

発売元 布亀株式会社

〒663-8585 兵庫県西宮市今津二葉町3番6号

製造販売元 新新薬品工業株式会社

〒930-2221 富山県富山市今市324番地