

第2類医薬品

液体のかぜ薬

ハイカゼ内服液K

さむけ

発熱

鼻水

のどの痛み 30mL

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

葛根湯

エキス製剤

△ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 長期連用しないでください

■ **相談すること** 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる) 等があらわれる
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる

(2) 5~6回服用しても症状がよくなりません

製造販売元 株式会社廣貫堂

富山市梅沢町2丁目9-1

お客様相談窓口 076-424-2259

配置期限

製造記号

¥450+税

登録品目番号 24-376

【成分・分量】 1日量3本 (90mL) 中

葛根湯エキス-A 8300mg
(カッコン 8.0g、マオウ 4.0g、タイソウ 4.0g) より製した
(ケイヒ 3.0g、シャクヤク 3.0g、カンゾウ 2.0g) エキス
シヨウキョウ 1.0g
添加物として、白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、エタノール、グリセリン、トメントール、プロピレングリコール、バニリン、ベンジルアルコール、香料を含有する。

【効能・効果】 かせの初期の諸症状 (発熱、寒け、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み)

【用法・用量】 成人 (15歳以上) 1回1本、1日3回食間に服用してください。まれに微量の沈殿が生じる場合があるので、よく振ってから服用してください。● (1) 用法・用量を厳守してください。 (2) 15歳未満の小児には服用させないでください。 (3) 成人 (15歳以上) は1回1本とし、1日3本を超えて服用しないでください。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。 (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。 (3) 他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります。) (4) 配置期限の過ぎた製品は使用しないでください。 8NA1