

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

下痢、食あたり、水あたりに ニツシン正露丸糖衣錠

食物を摂取し、消化・吸収の後、体外に排泄するまでの消化器官による疾患は、実に多種多様です。

暴飲・暴食によるもの、食あたり、水あたり、下痢によるもの等その原因も少なくありません。消化器官を正常に保ち、栄養状態を良好にして、健康な日常生活をおくることは、誰もが願うところです。

ニツシン正露丸糖衣錠は、平素かかり易い一般的な下記症状に優れた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある。)
 - 高齢者。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |
 - 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合
- まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けて下さい。

肝機能障害：全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

【効能・効果】

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便
(裏面につづく)

【用法・用量】

次の量を食後水又は白湯にて服用して下さい。

| 年 齢 | 1 回 量 | 1 日服用回数 |
|------------|---------|---------|
| 15才以上 | 4 錠宛 | 3 回 |
| 11才以上15才未満 | 3 錠宛 | |
| 5才以上11才未満 | 2 錠宛 | |
| 5才未満 | 使用しないこと | |

(1)小児に服用させる場合は保護者の指導監督のもとに使用すること。

【成分・分量】 本品 1 日量 (12錠) 中

日本薬局方 クレオソート……………270.0mg
日本薬局方 ゲンノシヨウコ末……………315.0mg
日本粉薬品(株)製 オウバク乾燥エキス……………315.0mg
(原生薬換算量1890mg)

添加物として、セルロース、アラビアゴム、プルラン、バレイシヨデンプン、乳糖、カルメロスCa、二酸化ケイ素、白糖、ゼラチン、タルク、炭酸Ca、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、酸化チタン、セラック、ヒマシ油、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTP シートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)
- 使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

〈PTPシートの取り出し図〉



おしだす

【お問い合わせ先】

製造販売元 渡辺薬品工業株式会社
富山市水橋町555番地
TEL. 076-478-0205